植 物 分 类 学 报 27 (5): 395—404 (1989)
Acta Phytotaxonomica Sinica

中国凤仙花属四新种

陈 艺 林
(中国科学院植物研究所，北京)

FOUR NEW SPECIES OF *IMPATIENS* (BALSAMINACEAE) FROM CHINA

CHEN YI-LING
(*Institute of Botany, Academia Sinica, Beijing*)

Abstract In the paper four new species of the genus *Impatiens* (Balsaminaceae) are described from China. They are *Impatiens fenghwaiana* Y. L. Chen, *I. wuyuanensis* Y. L. Chen, *I. jinggangensis* Y. L. Chen, and *I. hunanensis* Y. L. Chen.

Key words *Impatiens*; *I. fenghwaiana*; *I. wuyuanensis*; *I. jinggangensis*; *I. hunanensis*

关键词 凤仙花属；封怀凤仙花；婺源凤仙花；井冈凤仙花；湖南凤仙花

封怀凤仙花 新种 图1

Impatiens fenghwaiana Y. L. Chen, sp. nov.

Species ex affinitate *I. blepharosepalae* E. Pritz. ex Diels, a qua pedicellis basi unibracteatis, bracteis tenuiter membranaceis, roseis, deciduis; sepalis margine integris; formis lobis alae valde distinguenda.

Herba annua, 30—50 cm alta, caule succulento, erecto vel rarius ad basim adscendente, simplici vel interdum ramoso, viridi, in parte inferiore parse nigropunctato, nodis inferioribus incrassatis, radicibus fibrosis numerosis. Folia membranacea, alterna vel ad apicem caulis aggregata, petiolata, ovata vel ovato-lanceolata, apice acuminata, basi in petiolum 1.5—2.5 cm longum cuneatim angustata, eglandulosa, margine grosse crenata, mucronulata, supra intense viridia, subtus pallide viridia, utrinque glabra, nervis lateralibus 7—9-paribus, arcuatis. Pedunculi graciles, in axillis foliorum superiorum solitarii, foliis multo breviores, flores 2—3, rarius 1 vel 4 in numero, subracemoso-dispositi; pedicelli graciles, 5—12 mm longi, basi unibracteati, bracteae tenuiter membranaceae, late ovato-cordatae, roseae, 8 mm longae, 7 mm latae, inconspicue cuspidatae, deciduae. Flores ad 3.5 cm expansi, rosei. Sepala lateralia 2 oblongo-ovata, 8—9 mm longa, 7 mm lata, obscure mucronulata. Vexillum suborbiculare, 12 mm longum, 14 mm latum, apice recavum, basi leviter cordatum, dorso anguste carinatum. Alae subsessiles, 17 mm longae; lobus basalis parvus, oblongo-obovatus, 4 mm longus, basi cuneatus, lobus distalis late dolabriformis, 17—18 mm latus, apice obtusus; auricula dorsalis parva, se-

1988.06.16 收稿。



图 1 封怀凤仙花 *Impatiens fenghwaiana* 1. 植株 habit; 2. 苞片 bract; 3. 侧生萼片 lateral sepals; 4. 旗瓣 standard; 5. 翼瓣 wing-petals; 6. 唇瓣 lip; 7. 子房 ovarium; 8. 花丝及花药 filaments & anthers.

milunaris, inflexa. Labellum anguste infundibulare, basi in calcar ad 2.5 cm longum, incurvum, apice clavellatum, integrum sensim attenuatum, ore obliquo vel adscendente, antice, apicu-

lato. Filamenta linearia; antherae ovatae, didymae, obtusae. Ovarium fusiforme, 2—3 mm longum, rectum, acuminatum. Capsulae lineares, ad 2 cm longae, apice rostratae.

Jiangxi (江西): Lushan (庐山), in prato herboso, locis umbrosis humidis, 1984.08.21, Chen Yi-ling et Hu Chi-ming (陈艺林,胡启明) 84-24 (Typus, PE); Lai Shu-shen et al (赖书绅等)8079; Hu Chi-ming (胡启明) 792; Nei Min-xiang (聂敏祥) 7454; Nei Min-xiang (聂敏祥) 6860; Ling Ying (林英) 13284; H. H. Hu (胡先骕) 2669; Nei Min-xiang et Lai Shu-shen (聂敏祥; 赖书绅)2405; C. C. Tsoong (钟补勤) 463。

一年生草本,高 30—50cm、茎肉质,直立或稀基部斜升,不分枝或有时分枝,绿色,下部常具黑色斑点,下部节膨大,具多数纤维状根。叶膜质,互生或在茎上端密集,卵形或卵状披针形,顶端渐尖,基部楔状狭成长 1.5—2.5cm 的叶柄,无腺体,边缘具粗圆齿状齿,具小尖,上面深绿色,下面淡绿色,两面无色;侧脉 7—9 对,弧状上弯。总花梗细,单生于上部叶腋,明显短于叶,2—3 花,稀 1 或 4 花,近总状排列;花梗纤细,长 5—12mm,基部具 1 苞片;苞片薄膜质,宽卵状心形,粉红色,长 8mm,宽 7mm,顶端微具小尖,脱落;花径 3.5cm,粉红色;萼片 2,长圆状卵形,长 8—9mm,宽 7mm,具不明显小尖;旗瓣近圆形,长 12mm,宽 14mm,顶端凹陷,基部微心形,背面具狭龙骨状突起;翼瓣近无柄,长 17 mm,基部裂片小,长圆状倒卵形,长 4mm,基部楔形,上部裂片宽斧形,宽 17—18mm,顶端钝,背部具半月形、反折的小耳;唇瓣狭漏斗状,口部斜或斜上,前端具小尖,基部渐狭成长 2.5cm,内弯,顶端棒状的距。花丝线形;花药小,卵圆形,顶端钝。子房纺锤状,长 2—3 mm,直立,渐尖。蒴果线形,长达 2cm,顶端喙状尖。花果期: 6—8 月。

本种近似缘毛萼凤仙花 *I. blepharosepala* E. Pritz. ex Diels, 但花梗基部具 1 枚与花同色的薄膜质苞片;苞片宽卵状心形,果期常脱落;萼片全缘,薄膜质;翼瓣裂片的形状等,与后者均有明显的区别。

婺源凤仙花　新种　图 2

Impatiens wuyuanensis　Y. L. Chen, sp. nov.

Species haec habitu *I. fenghwaianae* Y. L. Chen similis, sed a qua nervis lateralibus 5—6-paribus; bracteis elliptico-ovatis, purpureis, basi cuneatis; floribus purpureis, sepalis apice distincte cuspidatis, dorso inconspicue costatis; vexillo dorso anguste carinato, apice curvirostrato bene differt.

Herba annua, 30—50 cm alta, glaberrima, caule succulento, erecto vel ad basim adscendente, ramoso, viridi, striato in sicco, nodis inferioribus incrassatis, radicibus fibrosis numerosis. Folia membranaceae, alterna, petiolata, elliptico-ovata, 5—12 cm longa, 2.5—4 cm lata, apice breviter caudata vel acuminata, basi cuneata, in petiolum 2.5—4 cm longum anguste attenuata, margine grosse crenato-serrulata, mucronulata, supra viridia, subtus pallide purpurascentia, nervis lateralibus 5—6-paribus, arcuatis, in parte suprema petiolorum glandulis stipitatis 1—2-paribus instructa. Pedunculi graciles, in axillis foliorum superiorum solitarii, foliis breviores, flores 2—4 in numero, in inflorescentiam subracemosam dispositi; pedicelli graciles, 10—15 mm longi, fructiferi elongati, basi bracteati; bracteae tenuiter membranceae, elliptico-ovatae, purpureae, 5—7 mm longae, 3—4 mm latae, apice distinte cuspidatae, basi cuneatae, dorso inconspicue costatae, deciduae. Flores ad 2.5—3 cm axpansi, purpurei. Sepala 2, oblongo-ovata, 5—6(7) mm longa, 4—5 mm lata, apice conspicue cuspidata, 5—6-nervia. Vexillum

图2 婺源凤仙花 *Impatiens wuyuanensis* 1. 植株 habit; 2. 侧生萼片 lateral sepals; 3. 旗瓣 standard; 4. 翼瓣 wing-petals; 5. 唇瓣 lip; 6. 子房 ovarium; 7. 花丝及花药 filaments & anthers.

suborbiculare, 8 mm longum, 10—12 mm latum, basi subcordatum vel rotundatum, apice emarginatum, dorso anguste carinatum, curvirostratum. Alae 15 mm longae, sessiles; lobus basalis parvus, oblongo-ovatus, acutus, lobus distalis ampli-dolabriformis, 15 mm latus, apice emarginatus; auricula dorsalis parva, sublunata, inflexa. Labelli limbus anguste infundibularis, basi in calcar 2—2.5 cm longum incurvum vel leviter involutum, apice clavellatum sensim attenuatus, ore obliquo, 8—10 mm longo, antice conspicue apiculato. Filamenta linearia. Antherae parvae, didymae, obtusae. Ovarium rectum, fusiforme, 2 mm longum, acutiusculum. Capsulae 15—18 mm longae, subclavato-lineares, longe rostratae, apice minute 5-lobulatae, oligospermae. Semina oblonga, rugulosa, fusca.

Jiangxi (江西): Wuyuan (婺源), Zhan Jeshan (章阶山), alt. 500m, secus margines canali sub silvis, 1980.06.10, Wang Jianglin et al. (王江林等) 81093 (Typus, HLG)

一年生草本，高 30—50cm，无毛；茎肉质，直立或基部斜上，分枝，绿色，干时有条纹；下部节膨大，具多数纤维状根。叶膜质，互生，具柄，椭圆状卵形，长 5—12cm，宽2.5—4cm，顶端短尾尖或渐尖，基部楔形，渐狭成长 2.5—4cm 的叶柄，边缘具粗圆齿状细锯齿，具小尖，上面绿色，下面淡紫色；侧脉 5—6 对，弧状弯；叶柄上部具 1—2 对具柄腺体。总花梗细，单生于上部叶腋，短于叶，2—4 花，近总状排列；花梗细，长 10—15mm，果期伸长，基部具苞片；苞片薄膜质，椭圆状卵形，紫色，长 5—7mm，宽 3—4mm，顶端具明显小尖，基部楔形，背面具不明显的龙骨状突起，脱落。花紫色，径 2.5—3cm；萼片 2，长圆状卵形，长 5—6(7)mm，宽 4—5mm，顶端具明显小尖，5—6 条脉；旗瓣近圆形，长 8mm，宽 10—12mm，基部近心形或圆形，顶端凹入，背面具狭龙骨状突起，具弯喙；翼瓣长 15mm，无柄，基部裂片小，长圆状卵形，尖，上部裂片宽斧形，宽 15mm，上端微凹，背面具近肾形，反折的小耳；唇瓣檐部狭漏斗状，基部渐狭成长 2—2.5cm，内弯或稍弯曲，顶端棒状的距；口部倾斜，长 8—10mm，先端具明显尖头。花丝线形；花药小，二裂，顶端钝。子房直立，纺锤状，长 2mm，略尖。蒴果长 15—18mm，近棒状线形，具长喙，顶端具 5 齿裂。种子少数，长圆形，具皱纹，褐色。花果期 6 月。

外形酷似封怀凤仙花 *I. fenghwaiana* Y. L. Chen，但侧脉 5—6 对；苞片椭圆状卵形，紫色，基部楔形；花紫色；萼片顶端具明显尖头，背面具不明显的中肋；旗瓣背面具狭花骨状突起，顶端喙状上弯，与后者相区别。

井冈凤仙花　新种　图 3

Impatiens jinggangensis　Y. L. Chen, sp. nov.

Species *I. aquatili* Hook. f. proxima, a qua bracteis crassiusculis, lineari-lanceolatis persistentibus; floribus purpureis vel rarius intense roseis, sepalis oblique ovatis, apice longe cuspidatis, distincte nervosis; vexillo 10—11 mm diam., costa dorsali anguste carinata, alis brevioribus 10 mm longis, lobo distali dolabriformi, apice subacuto, labelli limbo late infundibulare, basi in calcar incurvum apice clavellato-bifidum attenuato differt.

Herba annua, 30—90 cm alta, glaberrima, caule succulento, erecto vel ad basim adscendente, simplici vel interdum breviter ramoso, viridi, striato in sicco, nodis inferioribus incrassatis, radicibus fibrosis numerosis. Folia submembranaceae, alterna, petiolata, ovato-lanceolata vel oblongolanceolata, 8—13 cm longa, 1.5—2.5 cm lata, apice acuminata, margine grosse crenata, setulis minutis interjectis, basi in petiolum 1.5—3.5 cm longum cuneatim angustata, ad-



图3 井冈凤仙花 *Impatiens Jinggangensis* 1. 植株 habit; 2. 侧生萼片 lateral sepal; 3. 旗瓣 standard; 4. 翼瓣 wing-petals; 5. 唇瓣 lip; 6. 子房 ovarium; 7. 花丝及花药 filaments & anthers.

basim petioli 2-glandulis stipitatis instructa, costa subtus prominenti, nervis lateralibus 5—7-paribus, arcuatis, supra viridia, subtus pallida. Pedunculi in axillis foliorum superiorum solitarii, foliis multo longiores, graciles, Flores 3—8 in numero, in inflorescentiam subcorymbosam dispositi; pedicelli 10—15 mm graciles, fructiferi paulum elongati, basi bracteati; bracteae 3—5 mm longae, lanceolatae vel lineari-lanceolatae, crassiusculae, acuminatae, persistentes. Flores 15—25 mm expansi, purpurei (ex collectore) vel interdum intense rosei. Sepala 2, oblique ovata, 8—9 mm longa, 3—4 mm lata, inaequilateria, apice longe cuspidata, conspicue nervosa. Vexillum suborbiculare c. 10—11 mm diam., apice leviter emarginatum, basi truncatum, costa dorso anguste carinata, apice mucronulata. Alae 10 mm longae, sessiles; lobus basalis subrotundatus, 5 mm longus, basi late cuneatus, Lobus distalis amplus, dolabriformis, apice subacutus; auricula dorsalis magna, inflexa. Labellum late infundibulare, basi in calcar ad 15—20 mm longum, incurvum, apice clavellatum bifidum attenuatum; ore subhorizontali vel leviter adscendente, 10—12 mm longo, antice acuto. Filamenta linearia; antherae parvae, obtusae, didymae, Ovarium fusiforme, 2—3 mm longum, rectum, apice acuminatum, minute 5-lobulatum. Capsulae lineares, 17—22 mm longae, rectae, rostratae, polyspermae. Semina fusca, obovoidea, c. 3 mm longa, minute tuberculata.

Jiangxi (江西): Jinggangshan (井冈山), Ninggan (宁冈), locis umbrosis et humidis ad marginem rivulorum, alt. 800m, 1965. 10. 08, Lai Shu-shen et Yang Ru-ju(赖书绅,杨如菊)5253(Typus, HLG),Lai Shu-shen et Wang Jiang-lin(赖书绅,王江林)9125; Tai He (泰和), Tien Hushan (天湖山), Lai Shu-shen et Wang Jiang-lin (赖书绅,王江林) 121. **Hunan (湖南)**; Yizhang (宜章), Mangshan (莽山), alt. 1240 m, ad marginem rivulorum in valle vel sub sylvis densis, 1964. 08. 13, Huang Maoxian (黄茂先) 112017.

一年生草本,高 30—90cm, 无毛。茎肉质，直立或基部斜升，不分枝或有时具短分枝,绿色,干时有条纹,下部节膨大,具多数纤维状根。叶互生,具柄,卵状披针形或长圆状披针形,长 8—13cm, 宽 1.5—2.5cm, 顶端渐尖,边缘具粗圆齿，齿间具细刚毛，基部楔状狭成长 1.5—3.5cm 的叶柄;叶柄基部有 2 枚具柄腺体;中脉在背面明显,侧脉 5—7 对,弧状弯,上面绿色,下面淡绿色。总花梗单生于上部叶腋,常明显长于叶; 3—8 花,近伞房状排裂;花梗细，10—15mm, 果期略伸长，基部有苞片; 苞片 3—5mm, 披针形或线状披针形,较厚,渐尖，宿存。花紫色或鲜粉红色，径 15—25mm; 萼片 2，斜卵形，6—9mm, 宽 3—4mm, 不等侧,顶端具长小尖,具明显的脉。旗瓣近圆形,径约 10—11mm, 顶端微凹，基部截形,背面中肋具龙骨状突起,上端具小尖，翼瓣长 10mm, 无柄 ,基部裂片近圆形，长 5mm, 基部宽楔形,上部裂片宽,斧形，略尖,背部具大而反折的小耳。唇瓣宽漏斗状，基部狭成长 15—20mm,内弯,顶端棒状 2 裂的距;口部近平展或略斜上,长 10—12mm,先端尖。花丝线形; 花药小而钝，二裂。子房纺锤状,长 2—3mm, 直立,顶端渐尖,具 5 细齿裂。蒴果线形,长 17—22mm, 直立,具喙。种子多数,褐色，倒卵形，长约 3mm, 具细瘤状突起。花果期 8—10 月。

本种外形略似水凤仙 *I. aquatilis* Hook. f., 但具线形、质厚、宿存的苞片;花紫色，稀深粉红色,具不等侧斜卵形萼片,且顶端具长尖头,脉明显;旗瓣背面中肋具狭龙骨状突起,上端具小尖;翼瓣较短;唇瓣具内弯棒状二裂的距,与后者显然不同。

湖南凤仙花 新种 图 4

Impatiens hunanensis Y. L. Chen, sp. nov.——*Impatiens duclouxii* sensu Hand.-Mazz., Symb. Sin. 7: 647. 1933, non Hook. f.

Species habitu *I. duclouxii* Hook. f. similis, sed foliis submembranaceis, minoribus, nervis lateralibus 5—6-paribus, floribus paucioribus (2—4); sepalis minoribus, oblique ovatis conspicue 5—6-nervulosis, infra apicem mucronulatis, dorso alarum auricula parva, semilunata, inflexa differt.

Herba annua, 30—60 am alta, caule succulento, erecto, simplici vel ramoso, striato in sicco, superne laxe puberulo, nodis inferioribus inflatis, radicibus fibrosis numerosis. Folia submembranacea, alterna, petiolata, ovata vel ovato-lanceolata, 5—13 cm longa, 2.5—5 cm lata, apice acuminata vel breviter caudata, margine grosse crenata vel crenato-serrata, setis minutis interjectis, basi in petiolum 2.5—4 cm longum, gracile angustata, costa subtus distincta, sparse puberula, nervis lateralibus 5—6-paribus, arcuatis, supra viridia, sparse adpresse hispidula, subtus pallida, ad costam puberula. Pedunculi in axillis foliroum superiorum solitarii, foliis multo breviores, stricti; racemus 3—4-florus; pedicelli graciles, 5—10 mm longi, fructiferi elongati, basi bracteati; bracteae triangulari-ovatae, 2—3 mm longae, concavae, carnosae, apice obtusiusculae, persistentes. Flores 2.5—3 cm expansi, flavi. Sepala 2, oblique ovata vel suborbicularia, crassiuscula, opaca, c. 5 mm diam., infra apicem mucronulata, distincte 5—6-nervulosa. Vexillum orbiculare, 10—12 mm diam. apice emarginatum, costa dorsalis medio cristata, crista deltoidea, acuta apice mucronulata, Alae 2.5 cm longae, breviter stipitatae, lobus basalis rotundatus, lobus distalis major et paulum longior, dolabriformis, apice rotundatus; auricula dorsalis parva, semi-ovata, inflexa. Labellum saccatum, ad 3 cm longum, basi in calcar 10—12 mm longum, apice uncinatum vel involutum subito attenuatum; ore obliquo 15mm longo, acuto. Filamenta anguste linearia, superne complanata; antherae acutae, demum connectivo fisso. Ovarium fusiforme, paullo falcatum, 3—4 mm longum, acutum. Capsulae immaturae 2.5 cm longae, clavatae, acuminatae, polyspermae.

Hunan (湖南): locus ignotus, 1938. 06. 19, C. Y. Wu (吴征镒) 10337。**Jiangxi (江西)**: Quannan (全南), Jiu Lianshan (九连山), alt 700m, loco rupis in valle, 1958. 06. 26, Lushan Bot. Gard. 1177 (Typus, HLG). **Guangdong (广东)**: Lianshan (连山), alt. 770m, ad marginem rivulorum in valle, sylvis sparsis, Tan Pei-xiang (谭沛祥) 58328; Lian xian (连县), Tianguanshan (天光山), alt. 800m, loco umbros in valle, Tan Pei-xiang (谭沛祥) 60063; Liannan (连南), alt. 700m, marginibus rivulorum in valle, Tan Pei-xiang (谭沛祥) 59101; Xinfeng (新丰), alt. 700 m, marginibus rivulorum sub sylvis densis in valle, Deng Liang (邓良) 7895。

一年生草本，高 30—60cm，茎肉质，直立，不分枝或分枝，干时有条纹，下部节膨大，具多数纤维状根，上部被疏短柔毛。叶近膜质，互生，具柄，卵形或卵状披针形，长 5—13 cm，宽 2.5—5cm，顶端渐尖或短尾尖，边缘具粗圆齿或圆齿状锯齿，齿间具细刚毛，基部狭成长 2.5—4cm 的细柄，中脉背面明显，被疏微毛，侧脉 5—6 对，弧状弯，上面绿色，被疏贴生短糙毛，下面淡绿色，沿脉有短毛。总花梗单生于上部叶腋，明显短于叶，劲直；3—4 花，排成疏总状；花梗细，长 5—10mm，果期几不伸长，基部具苞片；苞片三角状卵形，长 2—3mm，凹，肉质，稍钝，宿存。花黄色，径 2.5—3cm；萼片 2，斜卵形或近圆形，较厚而不透明，径约 5mm，顶端以下具小尖头，具明显 5—6 细脉。旗瓣圆形，径 10—12mm，顶



图 4　湖南凤仙花 *Impatiens hunanensis*　1. 植株 habit; 2. 侧生萼片 lateral sepals; 3. 旗瓣 standard; 4. 翼瓣 wing-petals; 5. 唇瓣 lip; 6. 子房 ovarium; 7. 花丝及花药 filaments & anthers; 8.花药 an anther.

端凹，背面中肋具鸡冠状突起，冠突三角形，急尖，顶端具小尖；翼瓣长 25mm，具短柄，基部裂片圆形，上部裂片较大，稍长，斧形，顶端圆形，背部具半卵形，反折的小耳；唇瓣囊状，

长达 3cm，基部急狭成长 10—12mm，钩状或内卷的距，口部斜上，长 15mm，先端急尖。花丝线形，上部扁平；花药尖，药隔分裂。子房纺锤状，略呈镰刀形，长 3—4mm，尖。蒴果(未成熟)长 2.5cm，棒状，顶端尖；种子多数。

本种外形酷似云南产的滇南凤仙花 *I. duclouxii* Hook. f.，但以叶近膜质，较小，具 5—6 对侧脉；花 2—4；萼片斜卵形，近顶端具小尖头，有 5—6 条明显细脉；翼瓣背部具半卵形反折的小耳与后者相区别。前人曾将采自湖南武岗云山的植物误列于滇南凤仙花，显然是不适宜的。虽然我们未看到所引证的标本，但从上述的标本与该种的原始记载相比较，无论在叶的质地，或是侧脉的数目和花的各部形态都有所不同。因此，Handel-Mazzetti 采自湖南的植物无疑应为本种。

出 版 消 息

《中国植物红皮书》(中文版及英文版)和《中国珍稀濒危植物》三本专著，是在国家环境保护局主持下，由中国科学院植物研究所组织有关单位的专家教授编著审定而成。书中介绍首批确定的我国珍稀濒危植物 388 种的现状、形态特征、地理分布、生态学和生物学特性、保护价值、保护措施和栽培要点等内容。可供从事植物、林业、环保、教学等科教人员参考使用。

《中国植物红皮书》内容详尽，每种植物配有 1—3 幅彩图、分布图和参考文献，将于 1990 年第一季度由科学出版社出版，需购书者，请与该社发行科联系，地址：100707，北京市东黄城根北街 16 号。

《中国珍稀濒危植物》内容简明，配有 24 面彩图和 301 幅黑白插图，将于 1989 年第四季度出版，欲购者请与上海教育出版社读者服务部贺炳康联系。地址：200031，上海市永福路 123 号。

新 刊 信 息

中国科学技术期刊编辑学会主办的《编辑学报》已经正式出版。

《编辑学报》是有关编辑学的综合性学术期刊，报道国内外有关编辑学，主要是科技期刊编辑理论研究成果，交流编辑实践经验，为培养编辑人才，提高期刊质量，促进科技交流服务。本刊设有理论研究、专题报告、编辑工程、期刊管理、出版知识、科技文章写作、海外信息、书刊评介等。

读者对象，主要是科技编辑人员，撰写各类科技文章的科技人员，大专院校编辑专业的师生等。

《编辑学报》为季刊，国内定价每本 2.00 元，全年 4 期，共计 8.00 元，本会团体和个人会员 9 折优惠。订阅者请邮局汇款至“100081，北京海淀区学院南路 86 号 716 室中国科学技术期刊编辑学会发行组”。